

## KDE JEŠTĚ WOBENZYM MŮŽE POMOCI PŘI GYNEKOLOGICKÝCH PROBLÉMECH?

### • gynekologické záněty, chlamydiové infekce

Chlamydiové infekce a bakteriální gynekologické záněty se zásadně léčí antibiotiky. Enzymy obsažené ve Wobenzymu při současném podávání s antibiotiky zlepšují jejich průnik do zánětem zasažených tkání, a tím zvyšují účinnost léčby. Wobenzym také zlepšuje imunitu narušenou onemocněním, a tak výrazně snižuje riziko opakování gynekologických zánětů a chlamydiových infekcí a jejich přechodu do chronického stavu.

**Dávkování:** 3x5 (nebo 2x8) dražé Wobenzymu denně po dobu 2 týdnů. V počáteční fázi užívat spolu s antibiotiky a pokračovat i po skončení antibiotické léčby.

### • opakované vaginální mykózy

Z výsledků projektu provedeného v ČR vyplývá, že lék Wobenzym výrazně snižuje počet opakovaných vaginálních mykóz. 62 žen, které i přes standardní antimykotickou léčbu onemocněly mykózami 4krát až 9krát za rok, dostávalo Wobenzym. V následujícím roce došlo u všech k výraznému zlepšení – počet mykóz poklesl v průměru o 88%. Dvě třetiny žen dokonce neměly mykózy ani jednou.

**Dávkování:** 2x8 dražé Wobenzymu denně po dobu 10 týdnů. Wobenzym sice neléčí samotné mykózy, ale pomáhá řešit problém jejich opakování.

### • fibrocystická mastopatie

Při tomto chronickém onemocnění prsu s tvorbou cyst a vaziva, které trápí řadu žen, Wobenzym zmírňuje bolestivost a přináší výraznou úlevu.

**Dávkování:** 2x10 dražé denně, užívat nejméně po dobu 6 týdnů. Léčbu zahájit až po vyšetření lékařem!

### • lymfatické otoky (lymfedémy)

Wobenzym zlepšuje průchodnost lymfatických cév, urychluje vstřebávání lymfatického otoku. Nejvíce se osvědčuje komplexní léčba Wobenzymem v kombinaci s různými fyzioterapeutickými postupy (bandážování, manuální nebo přístrojová lymfodrenáž, speciální cvičení). Účinek Wobenzymu je největší, jestliže je léčba zahájena už v latentním (skrytém) stadiu lymfedému, kdy je onemocnění teprve na počátku.

**Dávkování:** Zahájení léčby 2x10 nebo 3x7 dražé denně, později snižovat až na 3x3 dražé. Úvodní dávku užívat minimálně 4-5 týdnů, dále dle výsledků léčby a doporučení lékaře.

#### Způsob užívání

Wobenzym užívat nalačno, nikdy s jídlem, nejméně 2 hodiny po posledním předcházejícím jídle a alespoň ½ hodiny před dalším jídlem. Nerozkousané tablety vydatně zapít nejméně 200 ml tekutiny (voda, čaj, minerálka). Nesprávné užívání léku snižuje jeho vstřebávání a tím i účinek!

více na [www.wobenzym.cz](http://www.wobenzym.cz)

konzultace na tel.: 267 750 003

Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Při těhotenství a v průběhu kojení vždy konzultujte užívání Wobenzymu s lékařem.

# TRÁPÍ VÁS OTOKY? VÍTE JAK URYCHLIT HOJENÍ?

**Wobenzym®  
může pomoci  
i Vám**

**Urychluje vstřebávání  
otoků a hojení ran.  
Pomáhá zajistit tvorbu  
menší jizvy.**



Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Při těhotenství a v průběhu kojení konzultujte s lékařem!

Telefonické konzultace na tel.: 267750003

MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhřetíněveská 448, 252 43 Průhonice, [www.wobenzym.cz](http://www.wobenzym.cz)

# VÍTE, JAK PROBÍHÁ HOJENÍ PO OPERACÍCH?

To, co pacienta po operaci nejvíce trápí, jsou otok, zánět a bolest.

Kdo z nás se už někdy neporanil? Při běžné činnosti v domácnosti, na zahrádce, na pracovišti nebo při sportu? V podstatě stejná rána doprovází také každou operaci. Rozdíl je jen v tom, že k porázové ráně dochází zpravidla náhodou, zatímco rána po operaci vzniká nezbytným zásahem lékaře do organismu ve snaze pomoci pacientovi.

## Každá operace je vědomým poraněním

Z tohoto pohledu je každá operace úmyslně provedeným poraněním za účelem nápravy vzniklého problému. Způsobí ránu, poškodí tkáň, zničí některé cévy a vyburcuje náš imunitní systém k ohraňování, vyčištění a napravení škody. Rozhodující úlohu přitom hraje zánět.

## Zánět je přirozenou reakcí organismu

Zánět sám o sobě není nic špatného, naopak, patří k základním nástrojům naší imunity. Jeho cílem je obrana proti škodlivinám, které pronikly do rány, a také obnova poškozených tkání. Podílejí se na něm faktory zajišťující srážení krve, cévní a lymfatický systém a nejrůznější složky imunity. Ideální je, když se poškození a jeho následky zvládnou co nejrychleji, když zánět proběhne jako akutní reakce a bez následků odezní.

## Proč se někomu rány hojí déle?

Rychlost hojení do značné míry závisí na rozsahu samotné rány – déle bude trvat zhojení výměny kyčelního kloubu než např. rány po vytržení zubu u zubaře. Navíc se každý z nás hojí jinak. K poruchám hojení přispívají cévní choroby (ateroskleróza, chronická žilní nedostatečnost), ale také nedostatečná funkce lymfatického systému. Rány se všeobecně hůře hojí s přibývajícím věkem. Zvlášť intenzivně trápí tento problém nemocné cukrovkou, nevyhýbá se ale ani mladším lidem v produktivním věku.

## Pozor na možné komplikace!

Pooperační rány obvykle doprovázejí otoky, krevní výrony a podlitiny, které mohou zpomalovat hojení a jsou také jednou z příčin bolesti. Závažnou komplikací rány bývají různé infekce, které se do ní mohou dostat – pak je zpravidla nezbytné nasadit antibiotika. Každá rána se hojí jizvou. Pro výsledný kosmetický efekt operace by měla být pooperační jizva co možná nejmenší. To je velmi důležité především u plastických, ale i u gynekologických operací.

## Enzymy pomáhají při hojení ran

Nezastupitelné místo v procesu hojení ran patří proteolytickým enzymům (enzymům štěpícím bílkoviny), které má každý z nás ve svém těle. Usměrnují průběh zánětu tak, aby proběhl co nejučelněji a nejrychleji. V některých stresových situacích, ke kterým patří také operační zákroky, tyto tělu vlastní enzymy už nestačí. Je proto vhodné je podpořit dodáním enzymů zvenčí prostřednictvím léků systémové enzymoterapie. Nejznámějším z nich je Wobenzym, který si lidé ve světě kupují už přes čtyřicet let.


# WOBENZYM MŮŽE POMOCI I VÁM

## Účinná pomoc po gynekologických operacích

Na každý chirurgický zákrok včetně některých výkonů při porodu, jako je např. „nastřížení hráze“, organismus reaguje zánětem, otokem a bolestí. Není výjimkou, že žena se po porodu kvůli otoku a bolesti nemůže ani posadit. Významným pomocníkem při hojení po operacích jsou enzymové léky, z nichž nejznámější je Wobenzym. Omezují vznik otoků a urychlují jejich vstřebávání, zmírňují bolest a zkracují dobu hojení. Enzymy také snižují výskyt pooperačních komplikací. A co je pro ženy také důležité – pomáhají zajistit tvorbu menší jizvy.

## Potvrzeno klinickými studiemi

Pomoc Wobenzymu v pooperační léčbě potvrdila řada klinických studií. Do srovnávací studie v ČR bylo zařazeno 112 pacientek po operativním odstranění dělohy léčených Wobenzymem a 131 pacientek po stejné operaci bez Wobenzymu. Srovnávány byly jednak laboratorní ukazatele akutního zánětu a hojení, jednak subjektivní hodnocení bolesti jednotlivých pacientek.



Vývoj prozánětlivého ukazatele CRP (C-reaktivního proteinu) v prvním pooperačním týdnu

Ve skupině pacientek léčených Wobenzymem došlo ke statisticky významným změnám v hlavních ukazatelích zánětu – CRP, leukocyty – ve prospěch rychlejšího utlumení zánětu a lepšího hojení. Patientky s Wobenzymem se cítily lépe a zaznamenaly rychlejší ústup bolesti. Studie tak potvrdila, že podpůrná léčba Wobenzymem napomáhá k lepšímu a rychlejšímu hojení také po větších gynekologických operacích.

## Kdy začít Wobenzym užívat?

Nejlepšího účinku dosáhneme, zahájíme-li podpůrnou léčbu Wobenzymem co nejdříve po operaci, samozřejmě po předchozí konzultaci s ošetřujícím lékařem. Ze začátku se podává vyšší dávka 3x7 až 3x10 dražé Wobenzymu denně, která se postupně podle odezvy léčby a hojení rány snižuje na 3x5, minimálně na 3x3 dražé denně. Celkovou denní dávku je přitom možné rozdělit na dvě části, které se pak užívají ráno a večer. Příklad: místo 3x7 dražé denně lze užívat 2x10 dražé za den. Léčba Wobenzymem je vždy součástí celkové péče o pooperační ránu.